




Istituto Superiore di Sanità
Centro Operativo AIDS



Giornata Mondiale dell'AIDS, 2009

Sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV



* nelle regioni/province dove è attivo un Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV

Fig. 1

Andamento delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per genere

(Piemonte, Liguria, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Puglia, Emilia Romagna, Lazio, Bolzano, Trento, Sassari e Catania)




Fig. 2

Età mediana delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per genere

(Piemonte, Liguria, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Bolzano, Trento, Sassari e Catania)




Fig. 3

Distribuzione percentuale delle nuove diagnosi di infezione da HIV per modalità di trasmissione

(Piemonte, Liguria, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Bolzano, Trento, Sassari e Catania)

■ Uso iniettivo di droghe ■ Contatti omo/bisessuali ■ Contatti eterosessuali ■ altro




Fig. 4

Nuove diagnosi di infezione da HIV per nazionalità

(Piemonte, Liguria, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Bolzano, Trento, Sassari e Catania)




Fig. 5



Istituto Superiore di Sanità
Centro Operativo AIDS

Giornata Mondiale dell'AIDS, 2009

Sorveglianza dell'AIDS

Cifre e principali caratteristiche dell'epidemia di AIDS in Italia dal 1982 ad oggi

Totale casi AIDS dall'inizio dell'epidemia	~ 62.000
Totale decessi AIDS dall'inizio dell'epidemia	~ 39.500
Percentuale di donne	~ 27%
Totale casi dovuti alla trasmissione madre-figlio	~ 716

1995

(anno in cui si è registrato il picco dell'epidemia)

Nuovi casi AIDS/anno: 5.655

Principale modalità di trasmissione:

**Uso iniettivo di droghe
(62,5%)**

**Età mediana alla diagnosi:
35 anni**

**Percentuale di stranieri:
4,7%**

2009*

Nuovi casi AIDS/anno: ~1.200

Principale modalità di trasmissione:

**Contatti etero/omosessuali
(~69%)**

**Età mediana alla diagnosi:
43 anni**

**Percentuale di stranieri:
~24%**

Fig. 6

Casi di AIDS per anno di diagnosi, e corretti per ritardo di notifica

N. di casi




Fig. 7

* Dati a Nov. 2009

Numero cumulativo delle persone viventi con AIDS, per anno




Fig. 8

*Dati a Nov. 2009

Persone che scoprono di essere HIV positive alla diagnosi di AIDS




Fig. 9

*Dati a Nov. 2009

Assunzione di terapie antiretrovirali prima della diagnosi di AIDS, e tipo di terapia effettuata

Assunzione di terapia antiretrovirale

Tipo di terapia antiretrovirale effettuata




Fig. 10

HIV in Italia: stime e confronto 1988 - 2008

Personae viventi con HIV/AIDS nel 2008
(una persona su quattro non sa di essere infetta) **170.000-180.000**

Nuove infezioni HIV diagnosticate nel 1988 **14.000-18.000**

1988

Principale modalità di trasmissione: uso iniettivo di droghe (71%)

Età mediana al primo test HIV positivo: 27 anni

Percentuale di stranieri: 4%

Nuove infezioni HIV diagnosticate nel 2008 **3.900-4.100**

2008

Principale modalità di trasmissione: contatti etero/omosessuali (74%)

Età mediana al primo test HIV positivo: 39 anni

Percentuale di stranieri: 32%